



## PROVES DIAGNÒSTIQUES DE SARS-CoV-2

El 2 de març del 2021 s'ha publicat l'actualització del *Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2* (<https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf>) que inclou la descripció de les proves diagnòstiques en els diferents entorns (Taula 1) i es resumeix en:

**A TOTS els casos** es recomana la realització de PCR o TAR fins el 5è dia de l'inici de símptomes.

**A TOTS els contactes estrets\*** s'ha de realitzar PCR.

**Pels cribratges** es recomana fer PCR o *Pooling* PCR. Tot i amb això, en estudis de cribratge periòdics d'individus asimptomàtics en alguns entorns i/o col·lectius específics, es pot valorar l'ús de TAR\*\* (pg.36).

**Taula 1:** Taula resum de l'ús de les proves diagnòstiques en els diferents entorns

	Atenció primària i urgències (CUAP i hospitalàries)	Entorns vulnerables (residències i centres de discapacitats)	Pacients ingressats en hospitals	Cribratges (qualsevol àmbit)
<b>Simptomàtics</b>				
< 5 dies evolució	TAR PCR posterior TAR negatiu i alta sospita clínica	TAR PCR posterior si TAR negatiu i alta sospita clínica	PCR o TAR PCR posterior si TAR negatiu i alta sospita clínica	X
> 5 dies evolució	PCR	PCR	PCR	X
<b>Asimptomàtics</b>				
	PCR	PCR	PCR	PCR <i>Pooling</i> PCR

**La definició de contacte estret\* és la següent:**

Qualsevol persona que hagi estat en el mateix lloc que un cas a una distància < 2 metres i durant un temps > 15 minuts, sense mesures de protecció (per exemple convivents, treballadors de la llar, visites i altres tipus de contactes esporàdics: sexuals, companys d'oci, etc.).

Per tal de concloure que s'ha mantingut una protecció adequada, s'ha de valorar de forma rigorosa l'existència de mesures de protecció durant tot el temps de contacte. Cal valorar també si ha estat en un espai tancat i poc ventilat. Els SVE poden ampliar la definició de

contacte estret atenent a les condicions del contacte. Com que la població general no ha rebut formació sobre la selecció i l'ús adequats de les mesures de protecció respiratòria, la determinació del contacte estret s'ha de valorar segons la possible exposició, independentment de si el contacte portava o no aquesta protecció. Actualment, no es recomana l'exclusió com a contacte estret de les persones que utilitzen mascaretes no homologades.

### **No s'han de fer proves diagnòstiques de retorn a la feina**

En general, no és necessari realitzar PCR o altres proves per reincorporar-se a l'activitat laboral una vegada finalitzat el període d'aïllament, tret d'indicacions específiques de les autoritats sanitàries.

### **Altres elements d'interès**

Podeu trobar altres elements d'interès a la *Guia d'actuació i col·laboració dels serveis de prevenció de riscos laborals per fer front a la pandèmia de COVID-19* (<https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/guia-serveis-prevencio-riscos.pdf>)